



DROESPROTOCOL

(STAL) PROTOCOL

Paard/pony met verdenking van droes

STAP 1
Isolatie. De isolatie afstand dient minimaal 10 - 25 meter te zijn.

STAP 2
Bezoek de stal.
Start met vaccinatie.

- Controleer of het paard droes heeft.
- Houd het paard in isolatie totdat deze geheel vrij is van droessymptomen.

STAP 3
Informeert de stal- en paardeneigenaren over droes, de risico's, gevolgen en eventuele preventieve maatregelen.

- Sluit de stal voor de aan- en afvoer van paarden.
- Informeert alle eigenaren en bezoekers over de uitbraak en de noodzaak van de maatregelen.
- Zorg voor een strikte naleving van alle isolatie- en hygiëne maatregelen.

STAP 4
Controleer en bekijkt alle paarden in de stal en deel de paarden op in drie groepen: rood, oranje en groen.

STAP 5
Hygiëne maatregelen.

Nadat de laatste klinische droesverschijnselen zijn waargenomen, dient het bedrijf nog vier tot zes weken gesloten te blijven voor andere paarden.

ROOD

- Hoog risico.
- Vertoont droesverschijnselen.
- Er is droes vastgesteld.
- Isoleer snel.

Wegens mogelijk dragerschap mogen paarden uit de rode groep pas vrij van droes verklaard worden nadat in een luchtzakspoeling of in drie neusswabs geen droes is aangetoond.

ORANJE

- Matig risico.
- Paard is in contact geweest met een besmet paard.
- Blijf deze groep monitoren. Wanneer u klinische droesverschijnselen signaleert, voegt u het paard onmiddellijk toe aan de rode groep.
- Temperatuur alle paarden twee keer per dag. Bij een lichaamstemperatuur boven de 38,5 °C verplaatst u het paard naar de rode groep.

GROEN

- Laag risico.
- Heeft geen contact gehad met paarden uit de rode of oranje groep.
- Blijf deze paarden monitoren. Wanneer er droesverschijnselen optreden, voegt u de desbetreffende paarden meteen toe aan de rode groep.

PREVENTIE VAN DROES DOOR VACCINATIE:

BASISVACCINATIE

- Vaccineer paarden en veulens vanaf vier maanden leeftijd tweemaal met een interval van vier weken. Vaccineer altijd in de bovenlip.
- Vaccineer veulens tweemaal met een interval van vier weken vóór het spenen of na aankomst bij de veulenopvang/opfok.

HERHALINGSVACCINATIE

- Op hoog-risicobedrijven : revaccinatie éénmaal in de drie maanden om de immuniteit te handhaven.
- Op bedrijven met een normaal risico: revaccinatie éénmaal in de zes maanden. De priming respons blijft dan gehandhaafd.

BIJ UITBRAAK

- Boostervaccinatie indien de laatste vaccinatie < 6 maanden geleden is gegeven.
- Start met een basisvaccinatie indien er in een koppel nog niet eerder gevaccineerd is.

LET OP:

- Verspreiders van droes vertonen niet altijd de bijbehorende klinische symptomen.
- Droes is geen aangifteplichtige ziekte, maar neem verantwoordelijkheid.

TIP: VACCINEER ALLE PAARDEN IN DE KOPPEL OF IN EEN STAL (TER VERLAGING VAN DE INFECTIEDRUK)



MANAGEMENTADVIEZEN VEULENS

- Veulens, jaarlingen en 2-jarigen scheiden van de volwassen paarden.
- Opfokgroepen:
 - Niet te groot (stabiele groepen).
 - Groepsindeling op basis van geslacht en leeftijd.
 - Eerste opvang in kleine groepjes.
 - Indien nodig: individuele stalling.
- Zorg voor een optimale gezondheid van de veulens en jaarlingen.
 - Voldoende beweging.
 - Goede voeding.
 - Ruime, frisse en droge stallen.
 - Goed veterinaire management (Influenza/tetanus en juist ontwormen).